




Technologia kompleksowego wsparcia rozwoju brokołu

ROLNICTWO
W WERSJI PRO



Osadkowski

Technologia DSG i nawożenie dolistne



Barrier Si-Ca należy wlewać do zbiornika na włączonym mieszadle, a przygotowaną ciecz roboczą od razu nanieść na rośliny. Barrier Si-Ca nie zaleca się łączyć ze środkami zawierającymi fosfor, wapń i materię organiczną.

Wsparcie odporności rośliny przed bakteriozami



INEX-A
50 ml na 100 l wody
do każdego zabiegu

+

IonBlue®
0,5 l/ha
zabieg stosować co 7-10 dni
w zależności od stopnia zagrożenia



! Działanie odżywcze oraz fitosanitarne miedzi i siarki.



TYGODNIE

- | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3-4 | 5 | 6-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FAZA 5. LIŚCIA | FAZA 6.-7. LIŚCIA | WIDOCZNY 2. PĘD BOCZNY | WIDOCZNY 3.-7. PĘD BOCZNY | 8, 9 LUB WIĘCEJ PĘDÓW BOCZNYCH | POCZĄTEK ROZWOJU RÓŻY | RÓŻA OSIAGA 20% TYPOWEJ WIELKOŚCI | RÓŻA OSIAGA 30% TYPOWEJ WIELKOŚCI | RÓŻA OSIAGA 50% TYPOWEJ WIELKOŚCI | RÓŻA OSIAGNĘŁA TYPOWĄ WIELKOŚĆ I KSZTAŁT |

Wsparcie naturalnej odporności przed mszycą kapuścianą, tantnisiem krzyżowi aczkciem, mączlikiem warzywnym, wciornastkiem

NA ZBIÓR LETNI

ZAPRAWIANIE ROZSADY ŚRODKIEM DO ZWALCZANIA SZKODNIKÓW



INEX-A

50 ml na 100 l wody do każdego zabiegu

+

+



MITEMINE
1,5 l/ha
stosować co 7-14 dni
w zależności od stopnia zagrożenia



MITEMINE
1,5-2 l/ha
zabieg powtarzać
co 7-10 dni
do końca zbioru

NA ZBIÓR JESIENNY



INEX-A

50 ml na 100 l wody do każdego zabiegu

+

+



MITEMINE
1,5 l/ha
stosować co 7-14 dni
w zależności od stopnia zagrożenia



MITEMINE
1,5-2 l/ha
zabieg powtarzać co 7-10 dni
do końca zbioru



TYGODNIE

FAZA 2. LIŚCIA FAZA 3. LIŚCIA



1

FAZA 5. LIŚCIA

2

FAZA 6.-7. LIŚCIA

3-4

WIDOCZNY 2. PĘD BOCZNY

5

WIDOCZNY 3.-7. PĘD BOCZNY

6-7

8, 9 LUB WIĘCEJ PĘDÓW BOCZNYCH

8

POCZĄTEK ROZWOJU RÓŻY

9

RÓŻA OSIAGA 20% TYPOWEJ WIELKOŚCI

10

RÓŻA OSIAGA 30% TYPOWEJ WIELKOŚCI

11

RÓŻA OSIAGA 50% TYPOWEJ WIELKOŚCI

12

RÓŻA OSIAGNĘŁA TYPOWĄ WIELKOŚĆ I KSZTAŁT

Sprawdź skuteczność działania produktów:



HumiCalc 4.0

- ▶ Stabilizuje pH
- ▶ Aktywizuje życie biologiczne
- ▶ Poprawia żyzność
- ▶ Odbudowuje strukturę gleby



MITEMINE

- ▶ Wzmacnia ściany komórkowe
- ▶ Inicjuje naturalną odporność rośliny przed szkodnikami
- ▶ Buduje wapniową tarczę ochronną



Rootex

- ▶ Dostarcza składniki pokarmowe NPK
- ▶ Zwiększa dostępność form przyswajalnych z roztworu glebowego
- ▶ Poprawia aktywność systemu korzeniowego



Maxi-Grow

- ▶ Wspomaga procesy metaboliczne
- ▶ Dostarcza roślinie energii po warunkach stresowych
- ▶ Intensyfikuje podziały komórkowe



Barrier Si-Ca

- ▶ Zwiększa wytrzymałość i odporność roślin na stres środowiskowy, choroby oraz szkodniki
- ▶ Poprawia trwałość pozbiorną
- ▶ Dostarcza niezbędny wapń



Inex-A

- ▶ Zwiększa efektywność zabiegów nalistnych
- ▶ Poprawia mieszalność preparatów
- ▶ Zwiększa penetrację powierzchni roślin



IonBlue®

- ▶ Uzupelnia składniki pokarmowe o Cu i S
- ▶ Wspiera odporność roślin przez uaktywnianie syntezy tkanek mechanicznych (ligniny)
- ▶ Wyróżnia się wysoką bioaktywnością dzięki nowoczesnej formulacji

Więcej informacji:



Gdzie kupić

 **Osadkowski**

W firmowych punktach handlowych
oraz u doradców

Dołącz do nas!

   
Osadkowski.pl