



Zaprawianie i ochrona herbicydowa ziemniaka

ZAPRAWIANIE BULW



Wysoka skuteczność na rizoktoniozę

MONCUT 460 SC
0,2 l/t

+



INEX-A
0,1 l/ha

+



MAXI-GROW
0,5 l/ha

+



ROOTEX
2 kg/ha

HUMICALC 4.0
250–500 kg/ha



- ▶ Aplikacja jesienna lub wczesnowiosenna
- ▶ Stabilizacja pH
- ▶ Aktywizacja życia biologicznego
- ▶ Poprawa żyzności
- ▶ Odbudowa struktury gleby

OCHRONA HERBICYDOWA

INIGO 500 SC – 2,0–2,5 l/ha
+ partner
(do wyboru zależnie od struktury chwastów na polu):

MIA 800 EC / BOXER 800 EC – 2,5–3,0 l/ha
lub

chlomazon 480 EC* – 0,1–0,15 l/ha

+

ATPOLAN SOIL MAXX – 0,5 l/ha

do każdego zabiegu przedwiosennego
lub

INEX-A – 0,1 l/ha

chwasty jedno- i dwuliścienne

TARGA MAX 10 EC
0,5–1 l/ha

+

ATPOLAN BIO 80 EC
1 l/ha

lub

INEX-A
0,1 l/ha

perz i poprawka
inne chwasty
jednoliścienne

zaprawianie bulw poprzez
aplikator na sadzarce
lub namaczanie

